

**PNDS 2020 14. Annexe 5.**

Fiche clinique SED

Fiche clinique SED (Docteur Karelle Bénistan) Date de la consultation \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Poids : \_\_ kg

Taille : \_\_ cm

Rapport E/T : \_\_\_\_

Hyperlaxité articulaire :

Entorses à répétition : Nombre < 10 / 10 à 30 / >30

Age des premières entorses : \_\_\_\_ ans

Doigt D G / Pouce D G / Poignet D G / Genou D G / Cheville D G / Orteil D G

Luxations vraies : Nombre < 10 / 10 à 30 / >30

Age des premières luxations : \_\_\_\_ ans

Épaules D G / Hanches D G / ATM / Rotules D G / Coudes D G / Doigts / Orteils

Subluxations / Rupture tendineuse

Localisation : \_\_\_\_\_

Sensation d'instabilité articulaire généralisée / Torsions douloureuses / Pseudo-entorses

Ligamentoplastie / TTA / Butée épaule Latarjet / Bankart épaule

Scoliose :

Localisation : \_\_\_\_\_

Angle de Cobb < 20 ° / Angle de Cobb > 20 ° / Arthrodèse

Luxations congénitales de hanches / Pieds bots / Pieds plats / Pieds varus / Pieds valgus / Pieds creux / Hallux valgus

Pectus excavatum / Pectus carinatum / Doigts en col de cygne / Arachnodactylie

Epicondylite / Ténosynovite / Bursite / Tendinites

Score de Beighton :

..../9

Hyperlaxité/ Fasciite plantaire

Normal

Score de Bulbena : ..../10

Pouce D Pouce

Auriculaire D MCP du Vème doigt

Coude D Coude

Pouce G Epaule

Auriculaire G Hanche

Coude G Rotule

Genou D Genou

Genou G Cheville

Colonne vertébrale MTP du 1er orteil

Ecchymoses

Hyperlaxité IPD / IPP / MCP / MTP / brachydactylie / Avant-pied large

Genu valgum / Genu recurvatum / Recurvatum des coudes / Rétractions tendineuses

Hyperlaxité

Figures de souplesse (grand écart, pieds derrière la tête, Y, lotus, ...) / Contorsionnisme

Fauteuil roulant : permanent / ponctuel

Passé / Présent

Autre aide à la marche : \_\_\_\_\_

Difficultés à marcher / Impotence fonctionnelle du MS / Chutes / Troubles proprioceptifs /

Sédentarisation / Retentissement socio-professionnel ou scolaire / Déscolarisation

**Autres symptômes :**

Difficultés d'apprentissages scolaires / RPM /Epilepsie / Dys / Troubles neuropsychologiques  
Ecchymoses ou hématomes fréquents avec hémostasie normale : Spontanés / Après chocs minimes /  
Extensifs

Troubles de la cicatrisation : Cicatrices atrophiques / Chéloïdes / Larges / Lâchage de sutures  
Localisations : Prétibiales / Genoux / Visage / Coudes / Post-chirurgicales / Post-plaie / Post-biopsie  
Hyperextensibilité cutanée / Peau veloutée / Vergetures inexpliquées / Finesse et fragilité cutanée  
/Acrogeria /Cutis laxa

Gingivorragies anormales / Epistaxis anormaux / Allongement du temps de saignement (prouvé  
avec hémostasie normale)

Papules piézogéniques des talons bilatérales

Douleurs musculaires / articulaires chroniques > 3 mois, sans syndrome inflammatoire biologique

Localisations : Rachis cervical / Dorsal / Lombaire / Hanches / Genoux / Chevilles / Épaules /  
Coudes / Poignets / Doigts

Crises douloureuses aiguës / Composante neuropathique au DN4 / Résistantes aux antalgiques  
usuels / Retentissement psychologique / Nécessité de suivi en centre de la douleur / Allodynie /  
EVA moyenne :   /10

Neuropathie périphérique : Ulnaire / Carpe / Tarse

Migraines

Maladies auto-immunes

Hypotonie musculaire / Diminution de la force musculaire / Contractures / Fatigabilité musculaire /

Élévation des CPK

Asthénie chronique

Dysplasie osseuse / Synostose / Ostéopénie / Fractures

Localisation : \_\_\_\_\_

Prolapsus valvulaire mitral / Dilatation de la racine de l'aorte / Valvulopathie / Dysautonomie /

HypoTA / Palpitations

Anomalies vasculaires artérielles : anévrisme / dissection

Localisation : \_\_\_\_\_

Habitus marfanoïde / Morphotype : \_\_\_\_\_

Myopie forte / Strabisme / Ptosis / Epicanthus / Sclérotique bleutée / FP obliques en bas et en  
dehors

SADAM / Luxations des ATM / Souplesse des cartilages du visage / Troubles de l'émail dentaire /  
Parodontopathie / Fragilité

dentaire / Anomalie de nombre des dents / Agénésie du frein lingual ou labial / Caries / Signe de  
Gorlin / Hypoacousie / Hyperacousie

/ Dysphonie / Rétraction gingivale / Malposition dentaire / Palais ogival / Luette bifide

TFI / Constipation sévère / RGO / Rupture intestinale / Hernies abdominales / Prolapsus rectal /  
Rectorragies / Autres

Asthme / Blocages respiratoires sévères / Insuffisance respiratoire chronique / Hémoptysies /

Dyspnée d'effort / Pneumothorax /

Terrain allergique / Tendance accrue aux infections / Apnées du sommeil

Grossesse en cours / Projet de grossesse / Prolapsus / ATCD de complications obstétricales /  
Rupture utérine / G\_P\_ / FCS / MAP/ Demande de DPN / Endométriose / règles « hémorragiques  
» / dyspareunie / Prolapsus du plancher pelvien / Dysurie / Pollakiurie /

Urgenturie / Incontinence / Absence d'envie d'uriner

Type de SED suspecté :

Classique

Hypermobile

Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

Un apparenté au premier degré / au deuxième degré remplit les critères diagnostiques 2017 de SED

Anomalie génétique identifiée :

---

Besoins : Kinésithérapie / Orthoprothésiste / Consultations :

---

Centre de référence MOC / Filière OSCAR - PNDS SED NV – Mars 2020/p.64